

Utipro® plus AF

CZ

Použití

Zdravotnický prostředek Utipro® Plus AF je určený k zvládnutí a prevenci infekcí močových cest (cystitid) způsobených patogeny, jako je E. coli a ostatní gramnegativní bakterie, běžně se podílející na vzniku urologických infekcí. Sloučenina založená na xyloglukanu (hemichelulóze) a želatině působí mechanicky ve střešním lumenu a zabraňuje kontaktu patogenů se střešními sliznicí, který je prvním krokem k jejich rozmnožení a následnému průchodu do močových cest.

Utipro® Plus AF je určený k perorálnímu užití od prvních příznaků onemocnění močových cest, s cílem snížit rychlost množení patogenů, které mohou vést k infekci. V případě opakovaných infekčních příhod je Utipro® Plus AF rovněž určený k prevenci nových příhod, při kterých je zmnožení patogenů příčinou opakovaných infekcí močových cest.

Balení

Balení obsahuje 15 nebo 30 kapslí v blistrech.

Složení

Každá tobolka obsahuje: xyloglukan 100 mg, želatina 50 mg, propolis 100 mg, Ibišek súdánský 100 mg (Hibiscus sabdariffa), oxid křemičitý, magnesium-stearát (rostlinného původu) a kukuřičný škrob.

Způsob užití

Spolkněte kapsli a zapijte tekutinou.

Dávkování

U pacientů s prvotními příznaky močové infekce se užívají orálně 2 kapsle Utipro® Plus AF denně (1 kapsle každých 12 hodin) po dobu pěti dní.

K prevenci opakování infekcí se užívá 1 kapsle denně minimálně 15 po sobě jdoucích dní v měsíci. V případě potřeby lze užívání opakovat.

Upozornění

- Diagnózu infekce močových cest by měl stanovit lékař. Pokud příznaky přetrvávají déle než 5 dní, poraďte se s lékařem.
- Akutní infekce močových cest může vyžadovat léčbu antibiotiky. Tento zdravotnický prostředek nemá baktericidní ani bakteriostatické vlastnosti, a tudíž nemůže nahradit léčbu antibiotiky. Nicméně Utipro® Plus AF lze podávat zároveň s antibiotiky.

- Doporučuje se, aby výrobek nebyl užíván v těhotenství a při kojení, pokud to neurčí zdravotnický odborník.
- Neužívejte výrobek po uplynutí expirační doby uvedené na balení.
- Neužívejte výrobek, je-li blistr otevřen nebo poškozen.
- Skladujte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kontraindikace

Utipro® Plus AF nesmí užívat pacienti se známou přecitlivělostí na xyloglukan, želatinu nebo jinou složku zdravotnického prostředku.

Distributor

Elva Pharma s.r.o., Dr. Janského 599, 252 28 Černošice, Česká republika, email: info@elvapharma.com
www.utipro.cz

SK

Použitie

Zdravotnícka pomôcka Utipro® Plus AF je určená na zvládnutie a prevenciu infekcií močových ciest (cystitída) produkovaných patogénmi, ako je E. coli a iné gramnegatívne baktérie, ktoré sa bežne podieľajú na vzniku urologických infekcií.

Preparát, zložený zo želatíny a xyloglukánu (hemichelulózy), pôsobí mechanicky vo vnútri čreva tým, že bráni kontaktu patogénov s črevnou sliznicou. Tento kontakt je prvým krokom k ich proliferácii a následnému prechodu do močového traktu.

Utipro® Plus AF sa užíva perorálne, od výskytu prvých príznakov ochorenia močových ciest, s cieľom znížiť šírenie patogénov, ktoré môžu viesť k infekciám. Pre prípad recidív infekcií je Utipro® Plus AF tiež určený na prevenciu nových prípadov, pri ktorých je šírenie patogénov príčinou opakovanej infekcie močových ciest.

Balenie

Balenie obsahuje 15 alebo 30 kapsúl v blistri.

Zloženie

Každá kapsula obsahuje: xyloglukan 100 mg, želatina 50 mg, propolis 100 mg, Ibištek súdánsky 100 mg (Hibiscus sabdariffa), oxid kremičitý, stearát horečnatý (rastlinného pôvodu) a kukuričný škrob.

Návod na užívanie

Prehltnite kapsulu spolu s tekutinou.

Dávkovanie

U pacientov s prvými príznakmi výskytu ochorenia v močovom trakte užívať Utipro® Plus AF perorálne, denne 2 kapsule (1 kapsulu každých 12 hodín) počas 5 dní. Pre prevenciu opakovaných infekcií treba užívať 1 kapsulu denne po dobu najmenej 15 po sebe idúcich dní v mesiaci. V prípade potreby možno liečbu opakovať.

Upozornenie

- Stanovenie diagnózy infekcie močových ciest (UTI) by mal urobiť lekár. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 5 dní, obráťte sa na svojho lekára.
- Akútna infekcia močových ciest môže vyžadovať liečbu antibiotikami. Tento prípravok nemá baktericídne alebo bakteriostatické vlastnosti a preto nemôže nahradiť antibiotickú liečbu. Avšak Utipro® Plus AF možno podávať súčasne s antibiotikami.
- Odporúča sa, aby sa prípravok neužíval počas tehotenstva alebo dojčenia, pokiaľ tak nedoporučí zdravotnícky odborník.
- Neužívajte po dátume expirácie uvedenom na obale.
- Neužívajte, ak je blister otvorený alebo poškodený.
- Skladujte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Kontraindikácie

Utipro® Plus AF sa nesmie používať u pacientov s precitlivosťou na xyloglukán, želatínu alebo na akúkoľvek inú zložku prípravku.

Distribútor

Elva Pharma s.r.o., Dr. Janského 599, 252 28 Černošice, Česká republika, email: info@elvapharma.com



Gyógyászati segédeszköz CE 0373

Javallat

Az Utipro® Plus AF az urológiai fertőzések (cisztitisz) kiváltásáért felelős kórokozók - pl. E. coli és más Gram negatív baktériumok - okozta húgyúti megbetegedések és fertőzések kezelésére, illetve megelőzésére szolgál. A xiloglukánon (hemicellulózon) alapuló, a béllumenhez mechanikusan kötődő vegyület megakadályozza a kórokozók és a bélnyálkahártya közötti érintkezést, ami a kórokozók elszaporodásának és az ezt követő húgyúti fertőzés továbbterjedésének első lépését jelenti. Az Utipro® Plus AF szájon át szedhető, a húgyúti megbetegedések első tüneteinek megjelenésétől kezdve, azzal a céllal, hogy megelőzzük azon kórokozók elszaporodását, amelyek fertőzéshez vezethetnek. Az Utipro® Plus AF a visszatérő fertőzések kialakulásának megelőzésére is alkalmazható, amely a kórokozók ismételt megjelenése és elszaporodása

lévén újabb húgyúti fertőzéseket eredményezhet.

Csomagolás

15 vagy 30 darab kapszulát tartalmazó buboréksomagolás.

Összetétel

Egy kapszula tartalma: xiloglukán 100mg, zselatin 50mg, propolisz 100mg, Hibiscus sabdariffa 100mg, szilícium-dioxid, magnézium-sztearát (növényi eredetű) és kukoricakeményítő.

Az alkalmazás módja

A kapszulát vízzel kell bevenni.

Adagolás

Akut húgyúti fertőzési tünetek esetén 5 egymást követő napon keresztül napi 2 Utipro® Plus AF kapszula bevétele ajánlott (12 óránként 1 kapszula szájon át). A visszatérő fertőzés elkerülése érdekében minden hónapban legalább 15 egymást követő napon keresztül napi 1 kapszulát szedjen. Szükség esetén a kezelés megismételhető.

Figyelem!

- A húgyúti fertőzés diagnózisát az orvosnak kell megállapítania. Ha a tünetek 5 napnál tovább fennállnak, keresse fel kezelőorvosát.
- Az akut húgyúti fertőzés antibiotikumos kezelést igényelhet. A termék nem rendelkezik baktériumellenes tulajdonságokkal és így nem helyettesítheti az antibiotikumos kezelést. Mindazonáltal az Utipro® Plus AF ezekkel egyidejűleg is alkalmazható.
- A termék használata nem ajánlott terhesség és szoptatás alatt, kivéve ha azt egészségügyi szakember írja elő.
- Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után.
- Ne használja a terméket, ha a buboréksomagolás kinyílt vagy megsérült.
- Szobahőmérsékleten, legfeljebb 25 °C-on, száraz helyen, hőforrástól távol tartandó. Fagyasztani tilos!
- Gyermekektől távol tartandó.

Ellenjavallat

Az Utipro® Plus AF-t nem használhatják xiloglukánra, zselatinra vagy a termék egyéb más összetevőire fokozottan érzékeny betegek.

Forgalmazó

Elva Pharma s.r.o., Dr. Janského 599, Černošice, 252 28 Česká republika, info@elvapharma.com
A forgalmazó helyi képviselője: Elva Pharma Kft, 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 5/4.
www.utipro.hu